

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Главного управления
по контролю качества лекарственных
средств и медицинской техники МЗ РУз
_____ Х.К.Джалилов
« 12 » января 2010 год

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ФарГАЛС
FarGALS

Состав: водная вытяжка из среды культивирования автотрофных железокисляющих бактерий.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептические и ранозаживляющие средства.

Фармакологические свойства

Препарат обладает широким спектром антимикробного действия: активен в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, неспорообразующих и споро образующих бактерий (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus subtilis*, *Clostridium perfringens*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter agglomerans*, *Serratia marcescens*, *Morganella morganii*, *Acinetobacter calcoaceticus*), а также грибов рода *Candida*. Кроме того, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие.

При местном нанесении усиливает обмен веществ ткани, повышает потребление ею кислорода, ускоряет регенерацию поврежденных клеток и тканей, способствует улучшению васкуляризации ишемизированных участков; уменьшает обсемененность раны, ускоряет очищение от гноя грануляцию, реэпителизацию и закрытие раны.

Показания к применению

Лечение инфицированных ран, гнойно-воспалительных заболеваний кожи, в том числе язвенной стадии острых некротизирующей формы кожного лейшманиоза (для предупреждения вторичного инфицирования кожных язв), цервицитов, кольпитов, вульвовагинитов бактериальной и микозной этиологии, эрозий шейки матки.

Способ применения и дозировка

Местно. При лечении инфицированных ран и гнойно-воспалительных заболеваний кожи применяется в виде аппликаций (в нативном или разведенном дистиллированной водой в соотношении 1:1 виде), 1-2 раза в сутки. Продолжительность лечения от 1 до 14 суток (в зависимости от площади поражения), при кожном лейшманиозе до 20 суток.

При лечении заболеваний женских половых органов для аппликации слизистых применяется в виде тампонов по 2 мл (в разбавлении с дистиллированной водой в соотношении 1:2), 1 раз в сутки. Продолжительность лечения 3-7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Побочные действия

Возможны: ощущение жжения при аппликации на раневую поверхность (при этом отмены препарата не требуется).

Лекарственное взаимодействие

Не допускается при обработке раны сочетание препарата со спиртовыми растворами йода!

Форма выпуска

Жидкость, по 25 мл, 50 мл, 100 мл во флаконах.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от +12° С до +25° С. При хранении допускается выпадение осадка.

Срок годности

2 года.

Отпуск без рецепта.

Не употреблять после истечения, указанного на упаковке срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте.

ООО "NPAF FarGALS"